Almirón DIGEST

50 años de investigación avanzada en salud digestiva

Nueva imagen, misma eficacia.

La fórmula de eficacia demostrada en la que ya confías, con un nuevo diseño.

Ayuda a reducir cólicos y estreñimiento en lactantes[1-6]

Digestión Eficaz
#StopLlantos

ALMIRÓN DIGEST:

REDUCCIÓN DE SÍNTOMAS EN **24H***[7]

NUEVA IMAGEN, MISMA FÓRMULA

- **Reducción de la irritabilidad,** en ~50% de los lactantes*[7]
- **Reducción del llanto, en** ~50% de los lactantes*[7]
- **Reducción de gases*[7]**

9 DE CADA 10 PADRES ESTÁN SATISFECHOS CON LA MEJORÍA DE SU BEBÉ[7]*

*Datos obtenidos a partir de encuesta de calidad de vida realizada con Almirón Digest a padres españoles con bebés con trastornos digestivos leves. Septiembre 2022.

Doble indicación demostrada: reduce el cólico y el estreñimiento[1-6]

Reduce los episodios de cólico y llanto[2]

70%



Extraída de Savino F, *et al.* Eur J Clin Nutr. 2006.

Mejora la frecuencia[4] y la consistencia de las heces[3,5]



Extraída de Schmelze H, *et al.* J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003.

50% **Reduce los episodios de estreñimiento y mejora los síntomas gastrointestinales[1]**

GRACIAS A SU **COMPOSICIÓN ÚNICA** CON **BENEFICIOS CLÍNICAMENTE PROBADOS**

β-PALMITATO
41% Betapalmitato

Heces más blandas[1-3,8-10]

PROTEÍNA PARCIALMENTE HIDROLIZADA

Facilita la digestión[1-3,12]

PREBIÓTICOS
scGOS/lcFOS(9:1)**

Equilibra la microbiota y mejora la consistencia de las heces[1,3,11]

CONTENIDO REDUCIDO EN LACTOSA

Reduce el malestar intestinal y el cólico[13]

****GOS:** galactooligosacáridos; **FOS:** fructooligosacáridos.

EFICACIA DEMOSTRADA EN **5 ENSAYOS CLÍNICOS** Y **1 ESTUDIO EN VIDA REAL**[1-6]

GAMA ALMIRÓN **No. 1** EN ESPAÑA
EN EL MANEJO DIETÉTICO DE PROBLEMAS DIGESTIVOS LEVES*

ALMIRÓN DIGEST
REDUCE LOS CÓLICOS Y EL ESTREÑIMIENTO[1-6]

ALMIRÓN AR
REDUCE EL REFLUJO Y LA REGURGITACIÓN[14-18]

Inscríbete en: NUTRICIA | PROFESIONALES **Síguenos en:**

*Fuente IQVIA & IRI MAT y YTD. Mayo 2024.

Referencias bibliográficas: 1. Veitl V, *et al.* J Ernährungsmed. 2000;(2):14-20. **2.** Savino F, *et al.* Eur J Clin Nutr. 2006;60(11):1304-10. **3.** Schmelze H, *et al.* J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003;36(3):343-51. **4.** Savino F, *et al.* Acta Paediatr Suppl. 2005;94(449):129- 32. **5.** Bongers MEJ, *et al.* Nutr J. 2007;6:8. **6.** Savino F, *et al.* Acta Paediatr Suppl. 2003;91(441):86-90. **7.** Data on file. Encuesta de calidad de vida realizada con Almirón Digest a padres españoles con bebés con trastornos digestivos leves. Septiembre 2022. **8.** Bar-Yoseph F, *et al.* Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2013;89(4):139– 143. **9.** Carnielli VP, *et al.* J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1996;23(5):553-60. **10.** Kennedy K, *et al.* Am J Clin Nutr. 1999;70(5):920-7. **11.** Scholtens PA, *et al.* World J Gastroenterol. 2014;20(37):13446–13452. **12.** Sánchez C, *et al.* Rev Esp Pediatr. 2012;68(3):206.213. **13.** Infante D, *et al.* World J Gastroenterol. 2011;17(16):2104-8. **14.** Vandenplas Y, *et al.* Eur J Pediatr. 1994;153:419-23. **15.** Borrelli O, *et al.* Ital J Gastroenterol Hepatol. 1997;29:237-42. **16.** Grosse K, *et al.* Kinderärztliche Praxis (German). 1998;69:204-10. **17.** Wenzl TG, *et al.* J Pediatrics. 2003;111:e355-9. **18.** Hegar B, *et al.* J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2008;47:26-30.

Aviso importante: La leche materna es la mejor opción para el bebé ya que proporciona múltiples beneficios a los bebés y las madres. Es importante que durante el embarazo y la lactancia, se mantenga una dieta sana y equilibrada. Combinar el pecho con otras fórmulas lácteas durante las primeras semanas del bebé puede reducir la producción de leche materna, haciendo más difícil la vuelta a una alimentación basada únicamente en leche materna. La madre debe consultar siempre con su médico y/o matrona cualquier duda sobre la alimentación del bebé. Si se utiliza una leche de fórmula, se deben seguir las instrucciones del envase para una correcta preparación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, y continuar hasta los 2 años o más junto a la alimentación complementaria. Deben tenerse en cuenta las consecuencias sociales y económicas del consumo de fórmula de inicio. El uso indebido de fórmulas infantiles o de alimentos o métodos de alimentación inadecuados puede significar un riesgo para la salud. Si se utiliza una leche de fórmula, se deben seguir las instrucciones del envase ya que una incorrecta preparación puede provocar que el bebé enferme.

Material exclusivo para el profesional sanitario: queda prohibida la distribución al público en general.

NUTRICIA

336140